Milkilyt®

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Lämmer, Ziegenlämmer, Fohlen
Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts

Zusammensetzung: Traubenzucker; Molkenpulver; Natriumchlorid; Natriumbicarbonat; Kaliumchlorid

Inhaltsstoffe: 5,0 % Rohprotein; 0,1 % Rohfett; 0,0 % Rohfaser; 29,6 % Rohasche; 10 % salzsäureunlösliche Asche; 6,0 % Natrium; 1,3 % Kalium; 6,1 % Chloride

Zusatzstoffe je kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 100 000 I.E. Vitamin A (3a672a); 5 000 I.E. Vitamin D 3 (3a671); 1 000 mg Vitamin E (all rac-Alpha-Tocopherylacetat) (3a700); 1 000 mg Vitamin C (3a300) **Technologische Zusatzstoffe:** Calciumformiat (E 238); kolloidales Siliziumdioxid (E 551b)

Nettomasse: 12,5 kg

Fütterungshinweis: 50 g Milkilyt pro Liter Wasser **(= Milkilyt-Tränke**) als Zwischentränke oder für 1 - 2 Mahlzeiten als alleinige Tränke verabreichen. Dieses Diät-Ergänzungsfuttermittel darf wegen des gegenüber Alleinfuttermittel höheren Gehaltes an Vitamin D nur an Kälber und Fohlen bis zu 200 g je Tier und Tag und an Lämmer und Ziegenlämmer bis zu 50 g je Tier und Tag verfüttert werden.

Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall).
Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Hinweis: Mindesthaltbarkeitsdauer setzt ordnungsgemäße und handelsübliche Aufbewahrung voraus. Dazu gehört insbesondere hygienische, kühle und trockene Lagerung. Keine Haftung bei falscher Behandlung und Lagerung.

Zulassungsnummer: α DE-BY-1-00008 2518

pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich
Nach VLOG-Standard zertifiziert (7079-140-2017-1)
Stoffstrombilanzangaben: 1,62 % P2O5; 0,80 % Stickstoff

Schwere Kälberdurchfälle haben einen starken Flüssigkeitsverlust zur Folge: ein 50 kg schweres Kalb kann bis zu 11 - 12 Liter an Flüssigkeit pro Tag verlieren. Dieser Wasser- und Elektrolytverlust kann hervorragend über die Milkilyt-Tränke ausgeglichen werden. Bei Durchfallbeginn muss sofort damit begonnen werden, Milkilyt zu ergänzen.

Diätplan für Aufzuchtkälber

Für jeden Milchviehhalter stellt das neugeborene Kalb ein Stück Zukunft seines Betriebes dar. Zur Sicherung dieser "Zukunft" ist auf eine peinliche Geburtshygiene zu achten. Das gleiche gilt für das Verabreichen der Biestmilch während der ersten Geburtswoche. Der folgende Diätplan wird bereits seit Jahren von vielen Betrieben mit Durchfallproblemen in den ersten 14 Lebenstagen erfolgreich angewandt:

1. Tag Biestmilch; innerhalb der ersten 6 Lebensstunden möglichst 2 – 3 Liter verabreichen.
2. - 7. Tag Biestmilch; zusätzlich 10 - 20 g Milki vital pro Mahlzeit.

Ab 8. – 20. Tag 150 g z.B. Milkra MA 17/Zucht Rot pro Liter Wasser; bei Bedarf 10 g Milki vital pro Mahlzeit.

Schwere Colidurchfälle (dünner, gelber Kot) erfordern unbedingt einen Diättag, z.B. 3 - 4 Liter Milkilyt-Tränke plus 20 g Milki vital pro Mahlzeit.

Diätplan für Einstallkälber

Die Rentabilität der Bullenmast ist sehr stark von einer optimalen Jugendentwicklung der zugekauften Kälber abhängig. Der folgende Plan ist so ausgerichtet, dass einerseits eine hohe Sicherheit und Leistung erzielt werden kann und andererseits eine optimale Entwicklung zum Wiederkäuer erreicht wird:

Am Einstalltag 4 - 5 Liter Milkilyt-Tränke (= 50 g Milkilyt pro Liter Wasser).

1. - 3. Tag 120 – 140 g z. B. Milkra Formel 35 pro Liter Wasser.
4. - 8. Tag 100 g z. B. Milkra Formel 35 pro Liter Wasser.

Eine Milkilyt-Tränke wird dann als Zwischentränke angeboten, wenn trotz Diätplan Durchfall auftreten sollte.

Trouw Nutrition Deutschland GmbH 86666 Burgheim Gempfinger Str. 15 · Telefon 0 84 32 / 89-0